МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ

Овсяница красная
Festuca Rubra L.

РЕВЕРЕНТ

Оригинатор
FELDSAATEN FREUDENBERGER GMBH & CO. KG

Регионы допуска
Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный

Урожайность
Урожайность семян 3,5 ц/га

Для газонных травосмфесей

Особенности развития

Октоплоид. Антоциановая окраска листового влагалища летом в год посева средняя – сильная. Корневище имеется. Растение полупрямостоячее – промежуточное. Интенсивность зеленой окраски средняя – сильная. Время вымётывания соцветия среднее – позднее. Флаговый лист длинный, средней ширины — широкий. Стебель длинный, соцветие длинное. Благодаря корневищам образует плотную и устойчивую к вытаптыванию дернину, после укоса отрастает слабо.

Мятлик луговой
Poa Pratensis L.

БРУКЛОУН

Оригинатор
FELDSAATEN FREUDENBERGER GMBH & CO. KG

Регионы допуска
Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный

Урожайность
урожайность семян 1,2-2 ц/га

Для игровых и спортивных газонов

Устойчив к ржавчине

Особенности развития

Антоциановая окраска листового влагалища слабая, волоски по краю влагалища и на обеих сторонах ниже листовой пластинки — редкие, на язычке листового влагалища волоски короткие. Опушение на верхней стороне листовой пластинки редкое, на краю основания пластинки бахромчатые волоски редкие. Куст осенью в год посева промежуточный, лист зелёный, средней ширины. Зимнее пожелтение листьев среднее. Время вымётывания соцветия на второй год среднее. Флаговый лист короткий, узкий — средней ширины. Стебель и верхнее междоузлие короткие. Соцветие: средней длины, антоциановая окраска средняя, нижние боковые веточки горизонтальные, форма оси напротив нижней стороны веточек наклонённая, шейки оси — закрытая.

Овсяница луговая
Festuca Pratensis Huds.

БИНАРА®

Оригинатор
ФНЦ «ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА»

Регионы допуска
Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный

Урожайность

- сухого вещества 12,9 т/га
- семян 6,5–8 ц/га

Для газонов

Для сенокосно-пастбищного использования

Слабо поражается болезнями и вредителями

Особенности развития

Тетраплоид. Лист осенью в год посева зелёный, средней ширины. Тенденция к образованию соцветий в год посева слабая. Время выметывания соцветия во второй год среднее. Куст осенью в год посева и при выметывании соцветия полупрямостоячий. Растение высокое. Флаговый лист средней длины, широкий. Стебель и верхнее междоузлие длинные. Соцветие средней длины - длинное.

Овсяница луговая
Festuca Pratensis Huds

ВИК 5

Оригинатор
ФНЦ «ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА»

Регионы допуска
Центральный, Средневолжский, Северо-Западный

Урожайность
7–8 т сухого вещества, 500–600 кг семян

Для сенокосного и пастбищного использования

Устойчив к болезням и вредителям

Особенности развития

Высокие зимостойкость и засухоустойчивость. Обладает высокой морозостойкостью, теневыносливостью, хорошо переносит частые скашивания, быстро после них отрастает.

Овсяница тростниковая
Festuca Arundinacea Schreb

ОТАРИА

Оригинатор
FELDSAATEN FREUDENBERGER GMBH & CO. KG

Регионы допуска
Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный

Урожайность
5,5–6,1 т/га сухого вещества



Для корма в травосмесях и в чистом виде

Для газонного использования

Особенности развития

Гексаплоид. Лист осенью в год посева светло — зелёный, узкий. Тенденция к образованию соцветий в год посева слабая — средняя. Время вымётывания соцветия во второй год раннее — среднее. Куст при вымётывании соцветия полупрямостоячий. Растение при вымётывании средней высоты - высокое. Флаговый лист длинный - очень длинный, средней ширины. Стебель средней длины, верхнее междоузлие средней длины. Соцветие при полном развитии средней длины. Стебель прямой, прочный. Лист зелёный, узкий - очень узкий, длиной до 52 см, шириной до 0,8 см. Облиственность — 43%. Соцветие метёлка, длиной до 23 см. Корневая система мочковатая, длинная. Содержание кремневой кислоты существенно снижено.

Райграс пастбищный
Lolium Perenne L

ДУЭТ

Оригинатор
ФНЦ «ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА»,ГУП МО «МОСКОВСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ», КАТКОВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, ООО СП «АГРОСЕМПОСТАВКА»

Регионы допуска
Северный, Центральный

Урожайность
- сухого вещества составляет 12 т/га
- семян райграса — от 800 до 1200 кг/га

Для пастбищного
и сенокосного возделывания

Особенности развития

Многолетний рыхлокустовой низовой злак ярового типа развития, с прямостоячими, гладкими, голыми, хорошо облиственными стеблями, высотой до 65 см, с большим количеством прикорневых листьев. Листья голые, сверху слабошероховатые, язычок короткий — до 1 мм длиной. Соцветие — колос длиной 15–25 см. Не выдерживает засухи и морозов в бесснежные и малоснежные зимы- при поздних весенних заморозках погибает. Хорошо отзывается на азотное удобрение и орошение, но не переносит близких грунтовых вод, не выносит длительного затопления полыми водами. Отличное кормовое растение, хорошо поедается всеми видами скота как на пастбище, так и в сене. Отличается высокой отавностью, быстро отрастает после стравливания, устойчив к выпасу скота- прекрасно выдерживает многократное скашивание. Частое стравливание или скашивание при внесении удобрений способствует его кущению.

Райграс пастбищный
Lolium Perenne L.

ГУСЛЯР

Оригинатор
РУП «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

Регионы допуска
Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный

Урожайность
5,5–6,1 т/га сухого вещества

Для газонного использования

Особенности развития

Обладает высокой зимостойкостью, хорошо отрастает после скашивания в смешанных травостоях. Оптимальная высота скашивания - 5 см при достижении травостоем высоты 12-15 см. Стебли овальной формы, высота 60-105 см, опушение отсутствует, окраска темно-коричневато-зеленая. Сильная кустистость. Высокая облиственность - 87%. Величина листьев 16-24 см, линейной формы, опушение отсутствует, темно-зеленой окраски. Соцветие - колос, длина соцветия 21-24 см, окраска зеленая. Колоски зеленые, овальной формы. Семена средней величины, длиной 5-6 мм, цвет сероватый. Мощная корневая система.

Фестулолиум
X Festulolium F. Aschers. Et Graebn

ПИЛИГРИМ®

Оригинатор
ФНЦ «ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА»

Регионы допуска
Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный

Урожайность

- зелёной массы 666,5 ц/га
- семян – 10,3 ц/га

Для использования в качестве компонента кормовых травосмесей

Особенности развития

Тетраплоид. Тип соцветия – колос. Форма роста растения без и после яровизации полупрямостоячая. Растение после яровизации высокое, средней ширины. Время вымётывания соцветий раннее. Растение при вымётывании соцветий средней высоты. Лист средней длины, средний - широкий. Флаговый лист короткий, средней ширины. Верхнее междоузлие растения длинное. Соцветие средней длины.

Тимофеевка луговая
Phleum Pratense L.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 204

Оригинатор
ФГБНУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРТОФЕЛЯ ИМЕНИ А.Г.,
ФГБНУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СЕВЕРО-ВОСТОКА ИМЕНИ Н.В. РУДНИЦКОГО»,
СПК «ХОХЛОМА», СПК «СЕМИНСКИЙ»,
ОАО «ПЕРЕВОЗСКАЯ СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ», ООО «ФИТО НН», ООО «СЕМЕНА»,
ООО «АГРОЭКОСИСТЕМЫ,
ООО СХП «РУССКОЕ ПОЛЕ»

Регионы допуска
Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Западно-Сибирский, Дальневосточный, Восточно-Сибирский

Урожайность
- зеленой массы 30–45 т/га
- сена 7–9 т/га
- семян 300–500 кг/га

Сравнительно устойчив к грибным болезням

Особенности развития

При сенокосном использовании хорошо развивается в двойных и тройных травосмесях с кострецом безостым и клевером луговым; сохраняется в травостое до 7 лет. При пастбищном использовании целесообразно высевать в смеси с мятликом луговым, клевером ползучим и гибридным; стравливается в течение вегетационного периода 2-3 раза, сохраняется при таком режиме использования на пастбищах 3-4 года. Сорт высокозимостойкий, требователен к влаге, хорошо произрастает на глинистых, суглинистых, песчаных почвах, осушенных торфяниках.

Клевер ползучий
Trifolium Repens L.

МЕРЛИН

Оригинатор
FELDSAATEN FREUDENBERGER GMBH & CO. KG

Регионы допуска
Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный

Урожайность
до 79 ц/га абсолютно сухого вещества

Для использования в качестве компонента кормовых травосмесей

Особенности развития

Центральный листочек длинный, широкий. Черешок листа средней длины и толщины. Столон толстый. Частота растений с белыми отметками очень высокая - до 95%. Время цветения среднее. По результатам экспертной оценки, проводившейся в 2009-2010 гг. на Кузьминичском ГСУ Калужской области, сорт зимостойкий, устойчив к полеганию, достигал высоты 40 см.

Люцерна изменчивая
Medicago Sativa L. Nothosubsp. Varia (Martyn) Arcang.

ВИКТОРИЯ®

Оригинатор
ФГБНУ «УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

Регионы допуска
Волго-Вятский, Уральский, Западно-Сибирский, Северо-Западный, ЦЧО, Восточно-Сибирский, Средневолжский

Урожайность
максимальная урожайность — 8,8 т/га

Для использования в качестве компонента кормовых травосмесей

Особенности развития

Люцерна изменчивая сорта Виктория формирует два укоса в год, а в благоприятные по погодным условиям годы — три. Созревает одновременно с возделываемым сортом Сарга. Формирует стабильные урожаи на слабоокультуренных почвах. Благодаря высокой холодостойкости хорошо растёт, развивается и зимует при позднелетнем посеве (15–21 июля) в условиях Свердловской области. Сорт устойчив к длительному, до 20 дней, переувлажнению почвы в весенний период.

Люцерна изменчивая
Medicago Sativa L. Nothosubsp.
Varia (Martyn) Arcang.

БЕЛГОРОДСКАЯ 7

Оригинатор
ООО «СЕМЕНА И ТРАВЫ»,
ЧЕРНЯВСКИХ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Регионы допуска
ЦЧО

Урожайность
средняя сухого вещества в регионе 66,9 ц/га

Для использования
в качестве компонента
кормовых травосмесей

Особенности развития

Растение весной средней высоты - высокое. Куст прямостоячий - полупрямостоячий. Зеленая окраска листьев средней степени выраженности. Центральный листочек средней длины и ширины. Время начала цветения раннее. Частота растений с очень темными сине-фиолетовыми цветками низкая, со смешанными, с кремовыми, белыми или желтыми цветками - отсутствует или очень низкая. Стебель при полном цветении средней длины - длинный. Растение, когда первый сорт в стадии выбрасывания цветочного бутона, после 1-го скашивания средней высоты - высокое, после 2-го скашивания - среднее, после 3-го - низкое - среднее.

Люцерна синяя
Medicago Sativa L. Subsp. Sativa

ЛЮЗЕЛЛЬ

Оригинатор
INRA-INSTITUT NATIONAL
DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

Регионы допуска
Центральный

Урожайность
средняя сухого вещества в 3 регионе 69,7 ц/га, на 1,2 ц/га ниже среднего стандарта

Для использования в качестве компонента кормовых травосмесей

Устойчивость к вертициллёзному увяданию низкая

Особенности развития

Растение спустя 2 недели после осеннего равноденствия низкое, весной - очень низкое - низкое. Время начала цветения среднее. Частота растений с очень тёмными сине-фиолетовыми цветками очень низкая - низкая, со смешанными цветками - низкая, с кремовыми, белыми или жёлтыми - отсутствует или очень низкая. Самый длинный стебель, включая головку, при полном цветении короткий. Растение, когда первый сорт в стадии выбрасывания цветочного бутона после 1-го и 2-го скашиваний низкое, после 3-го скашивания - очень-низкое - низкое.

Фацелия
Phacelia Tanacetifolia Benth.

ДАНА®

Оригинатор
ЧЕРНЯВСКИХ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Регионы допуска
Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный

Урожайность
семян 4–5 ц/га

Для кормового использования, возделывания на сидераты

Как медоностная культура

Слабо поражается и повреждается болезнями и вредителями

Особенности развития

Время начала цветения ранее. Куст прямостоячий. Высота растений от 55–75 до 90 см. Растение сорта имеет сильную антоциановую окраску черешков и жилок; цветы в фазу бутонизации — начала цветения имеют окраску венчика от белой до светло-голубой, в фазу полного цветения приобретают сине–фиолетовую окраску; слабое опушение стебля и листьев. Лист тёмно–зелёной окраски. Семена средне коричневой окраски.

Райграс однолетний
Lolium Multiflorum Lam.
Var. Westerwoldicum Wittm.

ИЗОРСКИЙ

Оригинатор
ФГБНУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРТОФЕЛЯ ИМЕНИ А.Г. ЛОРХА»

Регионы допуска
Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Дальневосточный

Урожайность

- зеленой массы 48–50 т/га
- сена 6,5–9,0 т/га, семян 800-1200 кг/га

Для сырьевого и зеленого конвейера (дает 23 укоса), для ремонта газонов

Сорт устойчив к вредителям и болезням

Особенности развития

Вегетационный период до первого укоса 35 – 42 дня, на семена (до хозяйственной спелости) 81 – 92 дня. Стебель мягкий, высотой до 105 см, не полегает. Куст прямостоячий, плотный. Быстро отрастает после первого укоса. Лист светло-зеленый, длинный. Соцветие сплошной колос длиной 12 – 30 см. Семена длиной 6 – 7 мм, продолговатые, остистые, светло-желтые.