



Соя
Glycine Max (L.) Merr

ЮКОН®

Оригинатор
ООО «КАНСИДС»

Регионы допуска
Центральный (5), Дальневосточный (12)





Высоко-
белковый



Полудетерми-
нантный тип




Очень
скороспелый

Основные характеристики


Вегета- ционный период, дней	Высота растений, см	Высота крепления нижнего боба, см	Способность к ветвлению, боковые ветви	Норма высева, тыс семян/га	Наибольшая урожайность*, ц/га	Содержание белка, %	Содержание масла, %
90-95	62	14	умеренное	600-650	46,7	40,35	22,10

* Малоархангельское ГСУ Орловской области 2020 год

Технологические особенности, баллы



Устойчивость к вредителям и болезням, баллы





Соя Glycine Max (L.) Merr **АЛЬБЕРТА®**

Оригинатор
ООО «КАНСИДС»

Регионы допуска
Центрально-Черноземный (5),
Дальневосточный (12)



Высокопротеи-
новый



Индетерминант-
ный тип



Очень
скороспелый

Основные характеристики


Вегета- ционный период, дней	Высота растений, см	Высота крепления нижнего боба, см	Способность к ветвлению, боковые ветви	Норма высева, тыс семян/га	Наибольшая урожайность*, ц/га	Содержание белка, %	Содержание масла, %
95–100	61	14	среднее	520-550	37	46,2	17,2

* в испытаниях Моздокское ГСУ Республики Северная Осетия-Алания 2011 г. В производстве — 28–31 ц/га, Суходол, Курская обл., 2020 г.

Технологические особенности, баллы



Устойчивость к вредителям и болезням, баллы



Соя
Glycine Max (L.) Merr

ФУЛФОРД®

Оригинатор
ООО «КАНСИДС»

Регионы допуска
Центральный (5), Дальневосточный (12)



Высокоуро-
жайный



Полудетерми-
нантный тип



Скороспелый
сорт




Основные характеристики

Вегета- ционный период, дней	Высота растений, см	Высота крепления нижнего боба, см	Способность к ветвлению, боковые ветви	Норма высева, тыс семян/га	Наибольшая урожайность*, ц/га	Содержание белка, %	Содержание масла, %
100-105	81	15	умеренное	600-650	40	43,5	18,5

Технологические особенности, баллы




Устойчивость к вредителям и болезням, баллы



НАВИГАТОР

ОЧЕНЬ РАННИЙ СОРТ (группа 000)



ПРЕИМУЩЕСТВА

РАННЕСПЕЛОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЛЕГАНИЮ

РАННИЙ СТАРТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип роста: индетерминантный
- Цвет волосков: рыжевато-коричневый
- Цветки: фиолетовые
- Форма листьев: заостренно-яйцевидная
- Цвет бобов: светло-коричневый
- Цвет рубчика: темно-коричневый

• Норма высева зависит от климатических условий:

Влаго-обеспеченность	Густота к уборке, тыс. растений/га	Норма высева, тыс. растений/га
Без орошения / Засуха	600 000	650-750
Под орошением / Осадки	550 000	600-660

- Междурядье: от 18 до 30 см
- Глубина высева: от 2 до 4 см
- Высевать при температуре >10°C при условии теплой погоды в ближайшие дни после сева

РЕКОМЕНДАЦИИ



ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

- Содержание белка: **39,8% сухого в-ва**
- Содержание масла: **22,2% сухого в-ва**
- Масса тысячи семян: **179 г**



АГРОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

НАЧАЛЬНЫЕ ТЕМПЫ РОСТА

очень слабо слабо средне хорошо отлично

ВЫСОТА КРЕПЛЕНИЯ НИЖНЕГО БОБА: 10,6 см

очень низко низко средне высоко очень высоко

ВЫСОТА РАСТЕНИЯ: 77 см

очень низко низко средне высоко очень высоко

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЛЕГАНИЮ

очень слабо слабо средне хорошо отлично

УСТОЙЧИВОСТЬ К РАСТРЕСКИВАНИЮ БОБОВ

очень слабо слабо средне хорошо отлично



ТОЛЕРАНТНОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

СКЛЕРОТИНИЯ

очень слабо слабо средне хорошо отлично

БАКТЕРИОЗ

очень слабо слабо средне хорошо отлично



ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ГЕРБИЦИДАМ

МЕТРИБУЗИН

очень слабо слабо средне хорошо отлично

Данные, приведенные в документе, предоставлены для ознакомления и могут меняться в зависимости от агрофона, климатических условий, технологии выращивания

ФАВОР

ОЧЕНЬ РАННИЙ СОРТ
(группа 000)



ПРЕИМУЩЕСТВА

ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
УРОЖАЙНОСТИ

НИЗКОРОСЛОЕ РАСТЕНИЕ

ТОЛЕРАНТЕН К СКЛЕРОТИНИИ,
ГНИЛЯМ И ВИРУСАМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип роста: полудетерминантный
- Цветки: фиолетовые
- Форма листьев: округло-овальная
- Цвет бобов: светло-коричневый
- Цвет рубчика: темно-коричневый

РЕКОМЕНДАЦИИ

• Норма высева зависит
от климатических условий:

Влаго- обеспеченность	Густота к уборке, тыс. семян/га	Норма высева, тыс. семян/га
Без орошения / Засуха	600 000	670-750
Под орошением / Осадки	550 000	600-660

- Междурядье: от 16 до 30 см
- Глубина высева: от 2 до 4 см
- Высевать при температуре >10°C
при условии теплой погоды
в ближайшие дни после сева



ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

- Содержание белка: **40,3% сухого в-ва**
- Содержание масла: **21,4% сухого в-ва**
- Масса тысячи семян: **183 г**



АГРОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

НАЧАЛЬНЫЕ ТЕМПЫ РОСТА

очень слабо слабо **средне** хорошо отлично

ВЫСОТА КРЕПЛЕНИЯ НИЖНЕГО БОБА: 11,6 см

очень низко низко **средне** высоко очень высоко

ВЫСОТА РАСТЕНИЯ: 74 см

очень низко низко **средне** высоко очень высоко

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЛЕГАНИЮ

очень слабо слабо **средне** хорошо отлично

УСТОЙЧИВОСТЬ К РАСТРЕСКИВАНИЮ БОБОВ

очень слабо слабо **средне** хорошо отлично



ТОЛЕРАНТНОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

СКЛЕРОТИНИЯ

очень слабо слабо **средне** хорошо отлично

БАКТЕРИОЗ

очень слабо слабо **средне** хорошо отлично

ВИРУСЫ

очень слабо слабо **средне** хорошо отлично



ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ГЕРБИЦИДАМ

МЕТРИБУЗИН

очень слабо слабо **средне** хорошо отлично

Данные, приведенные в документе, предоставлены для ознакомления и могут меняться в зависимости от агрофона, климатических условий, технологии выращивания

